健康公告

血糖控制
加州发展服务部

2024年3月

此公告是否有用?

请点击投票

控制血糖至关重要。血糖过高和过低都不是好事。这两种情况都会让人立时感觉不适,或是在以后的生活中不益健康。以下是有助于保持血糖健康的几点建议。资料来源:[CDC](#)、[妙佑医疗国际](#)

什么是血糖?它有何重要性?

血糖是指血液中的糖分,为人体提供能量。血液中的糖分来自摄入的食物。大多数人体都会不间断地工作,以保持血糖值始终介于健康范围内。

人体会产生一种名为胰岛素的激素,帮助管控人体使用和储存血糖的方式。糖尿病患者存在胰岛素分泌障碍,致使血糖值升至不健康水平。

资料来源:[克利夫兰医学中心](#)

健康和公告由发展服务部编制,旨在提醒接受服务的个人及其家庭和其他人等,留意在我们社区发现的特定风险。请接受以下调研,就本公告予以反馈,提出改进建议:公告调研

为何需要控制血糖？

控制血糖十分重要。血糖过高和过低都会导致严重的健康问题。血糖过低者会丧失正常思考和行动的能力。如果您的血糖过高且居高不下，随着时间的推移，这会损害身体。

资料来源：[美国糖尿病学会](#)

让血糖维持在正常范围内

以下是控制血糖的一些方法：

保持健康体重。咨询医生，明确自己的正常体重数值。

多吃新鲜果蔬。避开加工食品或包装食品。[见《预防与健康：健康饮食》公告。](#)

每天准时进餐。不要少吃一餐或几餐。

有规律地锻炼。

每天尽量至少锻炼20至25分钟。[见《预防与健康：生理健康》公告。](#)

避开含糖饮料，如苏打水和果汁。水是最健康的饮品！饮酒要适量，酒中含有大量糖。

资料来源：[CDC](#)

低血糖

低血糖的原因有很多, 包括:

少进一餐

摄入的具体食物, 包括一餐中的脂肪、蛋白质和纤维含量。

胰岛素水平。使用胰岛素治疗糖尿病的人士:

胰岛素用量过大

相比胰岛素用量, 未摄入足量碳水化合物。

使用胰岛素的时间

突然加大锻炼量, 延长锻炼时间或加大锻炼强度。

身处高海拔地区

天气湿热

经期

低血糖体征因人而异。一般症状包括:

颤抖

出汗

紧张或焦虑

易怒或意识模糊

眩晕或头晕眼花

疲倦或虚弱感

饥饿或恶心

心跳过快或心律不齐

嘴唇、舌头或脸颊有刺痛或麻木感

低血糖 (续)

低血糖具有危险性,应当立即治疗。如果您是糖尿病患者,或者知晓自己会出现低血糖症,那么,您需要了解自身症状,以便及早察知相应体征并妥善治疗。咨询您的支持团队和主治医生,了解您出现低血糖症状时可以摄入哪些食物/饮料。

若有低血糖的感觉,您可以立即进食,并告知支持团队。进食后等待15分钟,看看是否感觉好些。如果您有血糖监测仪,15分钟后测量一次血糖值。进食之后,血糖需要一段时间才能上升。请稍候片刻。

资料来源:[CDC](#);[CDC](#);妙佑医疗国际;DDS临床服务

何时拨打911

如果您担心自己血糖过低,随时可拨打911。

如果您在进食过后20分钟血糖仍然过低,或者常规治疗方式未起效。向医生咨询您的特别需求,明确如何应对紧急情况。

您可能需要特殊设备(血糖监测仪或血糖仪)或应急药物(胰高血糖素),以备不时之需。

如果您认为自己存在低血糖或患有糖尿病,即使并无症状,也要向医疗专业人士咨询如何测定血糖值。血糖监测仪或动态血糖监测仪(CGM)是血糖检测工具。

资料来源:[CDC](#);[CDC](#);妙佑医疗国际;DDS临床服务

高血糖

血糖过高且居高不下会逐渐损害身体或造成并发症。高血糖的原因有很多,包括:

- 患病。
- 压力。
- 食量超过预期。
- 糖尿病患者未使用足量胰岛素,或未口服糖尿病治疗药物。

不同人的高血糖体征可能存在差别。一般症状包括:

- 十分疲累。
- 口渴。
- 视力模糊。
- 尿频。

资料来源:[CDC](#)

如果您存在高血糖状况,请咨询主治医生,了解如何将血糖值保持在健康范围内。

其他资源

- [《预防与健康:健康饮食》
\(ca.gov\)](#)
- [《预防与健康:生理健康》
\(ca.gov\)](#)